

## Docteur Claire FOURCADE

Chirurgien Dentiste

Spécialiste en Chirurgie Orale

20 place de la Tour d'Auvergne - 29000 QUIMPER

Tel : 02.98.53.45.63

docteurclairefourcade@gmail.com

29 470 282 4



### Fiche d'information avant extraction des dents de sagesse

#### Pourquoi opérer ?

L'extraction des dents de sagesse consiste à enlever les troisièmes molaires du haut et/ou du bas. Ces dents doivent être extraites parce qu'elles sont en mauvaise position et sont à l'origine de douleurs et d'inflammation ou parce qu'elles risquent de perturber le bon alignement des dents chez l'enfant ou l'adolescent (l'indication est souvent portée par l'orthodontiste)

#### Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention se déroule sous anesthésie locale ou générale. L'extraction nécessite souvent la réalisation d'un fraisage de l'os après ouverture de la gencive. Selon les cas, la fermeture se fait à l'aide de fils qui disparaissent en 2 à 4 semaines. Le plus souvent, il est souhaitable de prévoir après l'intervention 2 à 3 jours d'arrêt de travail ou de dispense scolaire.

#### Les suites opératoires habituelles et les soins post-opératoires.

- Le gonflement des joues (oedème) est fréquent et parfois important.
- Les saignements : un petit saignement persiste pendant quelques heures à une nuit suivant l'intervention. Appliquer une compresse sur la zone de l'extraction et mordre sur celle-ci tant que le saignement ne s'est pas arrêté.
- Une excellente hygiène buccale est essentielle.

Les bains de bouche sont à commencer dès le lendemain et avec de l'eau froide. Après chaque repas, les dents et les gencives devront être nettoyées avec une brosse ultra-souple.

- La douleur au niveau des zones opérées est plus fréquente en bas qu'en haut. Elle cède souvent avec des antalgiques et disparaît en quelques jours. Des vessies de glace enrobées dans un linge (pas directement sur la peau) diminuent le gonflement et la douleur
- Une limitation de l'ouverture buccale est fréquente pendant quelques jours.
- Pendant les premiers jours, l'alimentation doit être molle, tiède ou froide. Il faut éviter une nourriture chaude au risque de faire saigner le site opéré. L'alcool et le tabac sont à proscrire avant et après l'intervention.

#### Les risques

Il peut s'agir de complications rares :

- Une alvéolite : inflammation de l'alvéole dentaire qui survient de quelques jours à 3 semaines après l'extraction. Elle peut entraîner des douleurs importantes et nécessiter des soins locaux.
- Une diminution de la sensibilité de la lèvre inférieure ou plus rarement de la langue car les nerfs cheminent à proximité de la dent et peuvent être irrités. Ce trouble de la sensibilité

est temporaire (quelques jours à quelques semaines), mais dans certains cas, la récupération peut être très longue (1 à 2 ans). Ce trouble est très exceptionnellement permanent.

- Une infection des tissus mous de la joue (cellulite) peut survenir quelques jours voire 2 à 3 semaines après l'extraction. Elle cède par un traitement antibiotique adapté.
- Une communication entre le sinus maxillaire et la bouche pour les dents supérieures, qui se ferme spontanément en 15 jours à 3 semaines. Une persistance au-delà justifie un traitement chirurgical adapté.

Ou de complications exceptionnelles :

- Expulsion de la dent de sagesse supérieure en haut dans le sinus maxillaire ou en arrière de celui-ci est très rare mais peut justifier une nouvelle intervention chirurgicale pour la récupérer.
- Fracture de l'angle de la mâchoire qui peut nécessiter de bloquer la mâchoire en position fermée pendant quelques semaines ou d'opérer en mettant des plaques et des vis.

En cas de complication, appelez le 02.98.53.45.63